

6-3-1 配合社區健康需求，提供社區家長或民眾相關健康資訊或服務

提供如戒菸服務、慢性病照護等醫療資訊



說明:利用學校網站提供社區家長或民眾相關健康資訊。




說明:利用班級line群組及發放校刊提供社區家長或民眾相關健康資訊。




說明:利用聯絡簿提供社區家長或民眾相關健康資訊。



說明:利用親職講座辦理家長菸害防制衛教宣導。



說明:利用班級line群組及聯絡簿提供家長戒菸服務醫療資訊。



說明:利用親職講座辦理家長及民眾慢性病照護衛教宣導。

臺南市新東國小學生癲癇發作緊急處理及注意事項



一、全身性抽搐時(大發作):

- 1、保持鎮靜，移開易造成傷害物品或桌椅。
- 2、溫和的協助孩子躺下，隨手拿毛巾或布類等墊于頭下。
- 3、協助側臥(或平躺側頭)，以便口水流出，並檢查口中是否有食物，予清除保持呼吸道通暢。
- 4、拿掉眼鏡及手中物品，鬆開衣領並檢查是否有外傷。
- 5、勿強行塞東西進口腔或撬開牙關，以免牙齒脫落，造成另一個傷害。
- 6、不要強制孩子抽搐動作，以免抗拒造成傷害。(抽搐動作無法靠外力阻止)
- 7、在抽搐未完全停止前勿急著搬動病人。(除非現場不安全，例如樓梯間)
- 8、在未完全清醒前，絕不能餵食或餵藥，避免噎到而引起吸入性肺炎。
- 9、孩子發作後會面臨一段『發作後疲倦期』，這段期間會覺得疲累、暴躁、意識混亂及困倦，照顧者務必陪同至完全清醒。
- 10、細心觀察孩子發作過程並做紀錄(發作過程、症狀、發作持續時間)，以做為就醫、用藥及照顧的參考。
- 11、若發現孩子有**癲癇重積狀態**(呼吸困難、膚色發紫、發作時間過長、連續性發作)或嚴重外傷時，請立即送醫。

※若有頭部撞傷時應特別留意其意識狀態。

二、非抽搐發作(失神發作)時:

- 1、冷靜再身旁守護至清醒。(一般很快就會清醒)
- 2、觀察並紀錄。

三、複雜型局部發作(精神運動發作)時:

- 1、冷靜在身旁守護，移開易造成傷害物品或傢俱。
- 2、勿強行拿開孩子手中物品或眼鏡。
- 3、細心觀察孩子發作過程並做紀錄，提供給老師、校護，以做為就醫參考。
- 4、在未完全清醒前，絕不能餵食或餵藥，避免噎到而引起吸入性肺炎。
- 5、務必陪同孩子至完全清醒。
- 6、待孩子完全清醒時讓他回憶發作過程，以澄清發作時是否有意識障礙。

※孩子有生病發燒、停藥或換藥及生理期時務必告知老師。

說明:利用親職講座辦理家長及民眾慢性病照護衛教宣導及醫療資訊。

提供簡易傷病處理



說明:提供社區民眾及家長簡易傷病處理。



說明:提供社區民眾及家長簡易傷病處理。



說明:提供社區民眾及家長口腔健康醫療服務。

提供各項健康資訊諮詢服務等



說明:提供社區民眾及家長各項健康資訊諮詢服務。



說明:提供社區民眾及家長各項健康資訊諮詢服務。



說明:提供社區民眾及家長各項健康資訊諮詢服務。



說明:提供社區民眾及家長各項健康資訊諮詢服務。